

# INSTRUCTIVO

## DEFINICIÓN DE VARIABLES:

- Sexo:** el que figura en documento de identidad
  
- Hipertensión arterial:** nivel de presión arterial sistólica (PAS) mayor o igual a 140 mm Hg, o nivel de presión arterial diastólica (PAD) mayor o igual a 90 mmHg.
  
- **Diabetes Mellitus:**
  - Dos o más glicemias  $\geq 126$  mg/ dl.
  - Respuesta a la sobrecarga a la glucosa alterada con una glicemia a los 120 minutos post sobrecarga  $\geq 200$ mg/dl.
  - Pacientes bajo tratamiento con insulina, hipoglicemiante orales.
  
- **Embolias y ACV:** Clínicamente puede corresponder a un accidente isquémico transitorio (AIT), stroke (ACV), oclusión arterial aguda, tromboembolismo pulmonar (TEP).
  
- Enfermedad coronaria demostrada:** antecedente de IAM y/o onda Q significativa en ECG, coronariografía con lesiones coronarias, cirugía de revascularización, historia de angor con test funcional positivo para isquemia.
  
- Enfermedad valvular:** afección valvular demostrada por Ecocardiograma.
  
- Cardiopatía chagásica:** afectación cardíaca sugerente y serología o xenodiagnóstico positivo.
  
- Miocardiopatías no isquémica:** todas las miocardiopatías distintas a la valvular, isquémica y chagásica.
  
- Pacientes sin Cardiopatía:** lo definimos pacientes sin historia CV (excepto la vinculada a la FA), con ECG y Ecocardiograma normal.
  
- FA Paroxística:** cesa espontáneamente; **Persistente:** no cesa espontáneamente, requiere cardioversión eléctrica o farmacológica (duración menor a 7 días); **Permanente:** perdura en FA (no se intenta cardioversión o no responde a esta).